

DESCRIPTION D'UNE COLLECTION D'ÉTUDE DES REPTILES (SAURIENS)  
NOUVELLEMENT INSTALLÉE DANS LES GALERIES,

PAR M. LOUIS ROULE.

PREMIÈRE PARTIE.

DES CHAMÉLÉONIDÉS AUX VARANIDÉS INCLUS.

J'ai signalé précédemment<sup>(1)</sup> que j'installais dans la galerie de Zoologie une collection d'étude des Reptiles, et, après avoir exposé la méthode que je comptais suivre, j'ai décrit et énuméré la première série mise en vitrine (Rhyncocéphales, Crocodiliens, Chéloniens). La collection des Sauriens vient de prendre place à la suite de la précédente. Le plan adopté n'a pas changé : chaque famille naturelle est représentée par ses espèces caractéristiques, en choisissant de préférence ces dernières parmi celles de la France, des pays européens limitrophes et de nos colonies. Les espèces de la faune française, avec leurs variétés principales, font toutes partie de la série.

La délicatesse de la plupart des pièces exposées, plus grande que pour les autres Reptiles, a nécessité l'emploi de deux procédés de présentation. Les individus de grande taille sont montés en peau, à sec, selon le mode habituel. Par contre, les petites espèces sont conservées en alcool dans des bocaux à demi inclinés, les exemplaires étant étalés sur des plaques de verre opaque, afin de faciliter autant que possible leur examen. Mention est donnée pour chaque échantillon, dans l'énumération suivante, du procédé employé.

FAMILLE DES **CHAMÆLÉONIDÉS.**

CHAMELEO CHAMELEO L. (le Caméléon ordinaire); Sud de l'Espagne, Afrique septentrionale, Asie Antérieure.

- 1° Groupe de plusieurs individus montés à sec;
- 2° Squelette monté.

(1) Même Recueil, année 1918, n° 5.

*CHAMELEO SENEGALENSIS* Daud. : Sénégal et régions voisines. (Montage à sec.)

*CHAMELEO PARSONI* Gray ; Madagascar, Île Maurice. (Montage à sec.)

*CHAMELEO OWENI* Gray ; Afrique Équatoriale occidentale. (Alcool.)

*BROOKESIA SUPERCILIARIS* Kuhl ; Madagascar. (Alcool.)

#### FAMILLE DES **GECKONIDÉS.**

*TARENTOLA MAURITANICA* L. (la Tarente) ; Sud de la France, régions méditerranéennes. (Alcool.)

*HEMIDACTYLUS TURCICUS* L. ; Sud de la France, régions méditerranéennes. (Alcool.)

*PHYLLODACTYLUS EUROPEUS* Géné ; Îles de la Méditerranée occidentale. (Alcool.)

*GECKO VERTICILLATUS* Laur. ; Asie orientale et méridionale, Insulinde. (Alcool.)

*PTYCHOZOON HOMALOCEPHALUM* Gray (le Gecko volant) ; Malaisie, Insulinde. (Alcool.)

*RHACODACTYLUS LEACHIANUS* Cuv. ; Nouvelle-Calédonie.

1° Individu en alcool ;

2° Squelette monté ;

3° OÙufs.

*STENODACTYLUS GUTTATUS* Cuv. ; Afrique septentrionale, Asie Antérieure. (Alcool.)

*PTYODACTYLUS LORATUS* Geoffr. ; Afrique septentrionale, Asie Antérieure. (Alcool.)

*PSILODACTYLUS CAUDICINCTUS* Dum. (sous-famille des Eublepharidés) ; Afrique occidentale intertropicale. (Alcool.)

*UROPLATUS FIMBRIATUS* Daud. (le Gecko-écroce, sous-famille des Uroplattidés) ; Madagascar. (Alcool.)

#### FAMILLE DES **LACERTIDÉS.**

*LACERTA OCELLATA* Daud. (le Lézard ocellé) ; France méridionale, Italie, péninsule Ibérique, Algérie, Tunisie, Maroc.

1° Individu monté à sec ;

2° Individu en alcool ;

3° Squelette monté.

LACERTA VIRIDIS LAHR. (le Lézard vert); France, Europe centrale et méridionale, Afrique septentrionale, Asie Antérieure. (Alcool.)

1° Plusieurs variétés, dont certaines sont considérées comme ayant valeur d'espèce;

2° Individu tératologique à queue bifide.

LACERTA VIVIPARA Jacq. (le Lézard vivipare); France, Europe centrale et septentrionale. (Alcool.)

LACERTA AGILIS L. et LACERTA STIRPIUM Daud. (le Lézard des souches); France, Europe centrale et septentrionale, Asie occidentale. (Alcool.)

LACERTA MURALIS LAHR. (le Lézard des murailles, le Lézard gris), France, Europe centrale et méridionale, Afrique septentrionale, Asie Antérieure. (Alcool.) Plusieurs exemplaires représentant les plus fréquentes des nombreuses variétés de cette espèce.

PSAMMODROMUS HISPANICUS Fitz. (le Lézard des dunes); France méridionale, péninsule Ibérique. (Alcool.)

PSAMMODROMUS ALGIRUS L. (le Tropidosaure); France méridionale, Italie, péninsule Ibérique. (Alcool.)

ACANTHODACTYLIS VULGARIS D. B.; France méridionale, Italie, péninsule Ibérique. (Alcool.)

OPHIOPS ELEGANS D. B.; Europe sud-orientale, Asie Antérieure. (Alcool.)

EREMIAS GUTTULATA Gray; Afrique septentrionale, Asie Antérieure. (Alcool.)

#### FAMILLE DES TÉIDÉS.

TUPINAMBIS TEGUIN L. (*Salvator Merianæ* D. B.; le Teju ou Sauvegarde); Amérique méridionale intertropicale.

1° Individus montés à sec;

2° Squelette monté.

DRACENA GUIANENSIS Daud.; Guyane, Brésil. (Montage à sec.)

CROCODILURUS LACERTINUS Daud. (le Crocodilure); Amérique méridionale intertropicale. (Montage à sec.)

#### FAMILLE DES XANTHUSIADÉS.

LEPIDOPHYMA FLAVOMACULATUM D. B.; Amérique centrale. (Alcool.)

FAMILLE DES **VARANIDÉS.**

*VARANUS ARENARIUS* Geoff. (le Monitor ou Varan du désert); Afrique septentrionale, Arabie, Asie Antérieure. (Montage à sec.)

*VARANUS NILOTICUS* L. (le Monitor ou Varan du Nil); Afrique entière, sauf la région septentrionale et occidentale. (Montage à sec.)

*VARANUS SALVATOR* Laur. (le Monitor ou Varan à bandes); Indes, Siam, Ceylan, Insulinde.

1° Individu monté à sec;

2° Squelette monté.